

# 10 вопросов и ответов про вирусный ГЕПАТИТ С



## Часть 2

**7**

### Почему надо лечиться?

Для хронического вирусного гепатита С характерно последовательное развитие рубцевания печеночной ткани (фиброз), которое постепенно переходит в свою завершающую стадию – цирроз. Этот процесс у каждого пациента длится по-разному. Кому-то отведено 20 лет жизни, а у кого-то для формирования цирроза достаточно 5 лет.

Это зависит от множества факторов – особенностей самого вируса, образа жизни пациента, сопутствующих заболеваний.

Главная цель лечения – остановить процесс рубцевания, продлить жизнь пациента, улучшить качество жизни.

Только под наблюдением врача можно контролировать этот процесс. Не оставляйте его на самотек. Не дайте шансов развитию цирроза.

**8**

### Легко ли лечиться?

Лечение вирусного гепатита С – это ответственный и сложный процесс. Вирус упорно сопротивляется, пытается измениться и выработать устойчивость к противовирусным препаратам. Поэтому важен последовательный прием препаратов длительное время.

Только врач может подобрать подходящую для пациента схему лечения, определить длительность, обезопасить от побочных эффектов терапии.

**9**

### Какова эффективность лечения?

Вирус гепатита С очень изменчив и активно вырабатывает устойчивость к противовирусным препаратам. Но ученые разрабатывают все новые и новые препараты и схемы лечения.

Если до 1998 года излечивались только 6 % среди получающих противовирусную терапию, то с появлением комбинированных препаратов длительного действия уже 50-60 % пациентов могли похвастать фактическим выздоровлением. Сейчас стоит задача 100 % эффективности лечения вирусного гепатита С.

**10**

## Что влияет на результат лечения?


### Улучшают прогноз:

- своевременное начало терапии;
- соблюдение режима приема препаратов;
- контроль веса и сахара;
- отказ от алкоголя и других психоактивных и наркотических препаратов;
- доверительные отношения с лечащим доктором;
- позитивный настрой на выздоровление.



### Ухудшают прогноз:

- длительный стаж инфицирования, высокая степень выраженности фиброза;
- возраст старше 40 лет;
- наличие других вирусов гепатита и ВИЧ;
- генотип вируса и его генетические особенности;
- высокая вирусная нагрузка (скорость размножения);
- ожирение;
- сахарный диабет;
- употребление алкоголя.



**Более подробную информацию можно узнать,  
обратившись в БУЗ УР «РКИБ МЗ УР» по телефонам:**

**(3412) 21-63-80, (3412) 64-64-39,**

**а также по ссылке:**

**<https://rkib18.ru/>**

